

C6



Patologie neuromusculara	Patologie osteoarticulara	Patologie postraumatica sportive	Patologie postraumatica
<ul style="list-style-type: none"> * Pareză (mono-, tetra-, hemi- și para-pareză) * neurodistrofii * scleroză multiplă * aplazie și/sau hipotrofie musculară regională * sechele neurologice post-accident vascular cerebral (inclusiv ciume ușoare până la moderate) * sechele post-polio * sechele ale postencefalopatiei din copilărie * mono- și polinevrite unilaterale sau bilaterale * sindroame radiculare în hernia de disc lombară sau alte discopatii * akinezie idiopatică * atonie sau mitrofie unilaterală sau bilaterală * sindr. piramidale și extrapiramidale * sindr. a canalului tarsal * recuperare în hipotrofie moderată (malnutritie proteino-calorică) * tulburări neurodegenerative 	<ul style="list-style-type: none"> * Osteoartrita și poliartrita (spondiloza, disartroza, lombara, osteoartrita soldului, gonartroza) unilaterală sau bilaterală * entorse/luxații și subluxații ale genunchiului și gleznei * întinderea sau ruptura ligamentelor încrucișate sau laterale ale genunchiului * discopatii sacrale incipiente sau avansate * Osteoartrita și poliartrita (spondiloza, disartroza, lombara, osteoartrita de sold, gonartroza) unilateral sau bilateral * entorse / luxații și subluxații ale genunchiului și gleznei * întinderea sau ruptura ligamentelor încrucișate sau laterale ale genunchiului * discopatii sacrale incipiente sau avansate * artrita reumatoidă 	<ul style="list-style-type: none"> * Tensiuni sau rupturi musculare îmbunătățite * monoartroza sau poliartrita membrului inferior (spondiloza, disartroza, coxartroza, gonartroza, osteoartrita mediotarsiana) * leziuni de menisc, în perioada de conservare * recuperarea postoperatorie a rupturilor de menisc * recuperare în plastia de ligament lateral și/sau încrucișat a genunchiului * recuperarea postoperatorie a rupturii tendonului lui Ahile * instabilități articulare post-forță sau leziuni post-traumatice puternice * recuperarea masei musculare după imobilizare prelungită * reduceri ale articulațiilor trenului inferior, de diferite grade * crește capacitatea de efort a trenului inferior * recupera în sindr. a canalului tarsal * coalescență puternică postcontusială a regiunii * refacerea tonusului muscular în urma intervențiilor chirurgicale vasculare, ortopedice, musculare etc * recuperare regională după traumatisme sau intervenții chirurgicale pe perineu * ameliorarea simptomelor din „coada de cal” 	<ul style="list-style-type: none"> * roseata și osteoartrita secundară la nivelul membrelor inferioare * Recuperare post-fractură a trenului inferior * recuperare postprotezată a soldului * recuperare postoperatorie în leziunile de menisc și ligamentul genunchiului * recuperare postoperatorie în afecțiunile chirurgicale și ortopedice ale gleznei * recuperarea masei musculare postmobilizare gips * recuperarea după hernie de disc operată * sindr. tunelul de tarsian operat * recuperarea fracturilor pelvine * refacerea tonusului muscular în urma intervențiilor chirurgicale vasculare, ortopedice, oncologice etc

	<ul style="list-style-type: none"> * rigidizarea articulațiilor în poziții vicioase vechi/consolidate * hiperlaxitate ligamentară a membrului inferior * luxații și subluxații congenitale de șold, cu modificări de postură și locomoție * deformari pelvine * sacr * Osteoartrita și poliartrita (spondiloza, disartroza, lombara, osteoartrita de sold, gonartroza) unilaterală sau bilaterală * entorse/luxații și subluxații ale genunchiului și gleznei * întinderea sau ruptura ligamentelor încrucișate sau laterale ale genunchiului * discopatii sacrale incipiente sau avansate * artrita reumatoidă * rigidizarea articulațiilor în poziții vicioase vechi/consolidate * hiperlaxitate ligamentară a membrului inferior * luxații și subluxații congenitale de șold, cu modificări de postură și locomoție * deformari pelvine * sacroiliita din spondilita anchilozantă * artrita reumatoidă * recuperare la adolescenți și tineri cu sechele de rahitism * artrita reumatoidă * recuperare la adolescenți 	<p>sindrom</p> <ul style="list-style-type: none"> * întărirea mușchilor membrului inferior pe toate segmentele acestuia 	
--	---	--	--

C13



Patologie neuromusculara	Patologie osteoarticulara	Patologie postraumatica sportiva	Patologie postraumatica
<ul style="list-style-type: none"> * Pareză (tetra-, hemi- și para-pareză) * neurodistrofii * scleroză multiplă * aplazie și/sau hipotrofie musculară regională * sechele neurologice post-accident vascular cerebral (inclusiv ciume ușoare până la moderate) * sechele după poliomielita * mono- și polinevrite unilaterale sau bilaterale * sindroame radiculare în hernia de disc lombară sau alte discopatii CDLS * torticolis * akinezie idiopatică * atonie sau mitrofie unilaterală sau bilaterală * recuperare post-sindrom. meningeală sindroame piramidale și extrapiramidale 	<ul style="list-style-type: none"> * polidiscopatie vertebrală CDLS incipientă sau avansată mono sau avansată * sindroame dureroase radiculare secundare patologiilor coloanei vertebrale * alergii secundare defectelor de postură * cifoscolioza * hiperlordoză * spondilită anchilozantă spondilată * deformari ale cutiei toracice artrita reumatoida 	<ul style="list-style-type: none"> * întindere sau ruptura mușchilor abdominali sau paravertebrali * refacerea forței musculare abdominale sau dorsale după imobilizare prelungită * spondiloza cu sau fără sindroame radiculare secundare * nevralgie intercostală spontană sau reziduală * favorizează creșterea capacității de efort a cutiei toracice * refacerea tonusului muscular după o intervenție chirurgicală abdominală sau pelviană * reeducarea contractiei musculare după hipertensiune post-efort sau rupturi micromusculare * refacerea tonusului muscular paravertebral după operații de hernie de disc * recuperarea post-contuzie a coloanei vertebrale * hernii de disc CDLS incipiente/avansate în timpul conservării sau coalescenței postoperatorii * coalescență postcontusională puternică a regiunii întărirea mușchilor abdominali, spatelui, feselor și paravertebrali CDLS 	<ul style="list-style-type: none"> * refacerea tonusului muscular după o intervenție chirurgicală abdominală sau pelviană * refacerea tonusului muscular paravertebral după operații de hernie de disc * întindere sau ruptura mușchilor abdominali sau dorsali * refacerea forței musculare după imobilizare post-chirurgicală sau ortopedică * Hernie de disc CDLS operată

C5



Patologie neuromusculara	Patologie osteoarticulara	Patologie postraumatica sportiva	Patologie postraumatica
<ul style="list-style-type: none"> * torticolis posttraumatic sau postural (chiar congenital) ** Pareză (mono-, tetra-, hemi- și para-pareză) * neurodistrofii * scleroză multiplă * aplazie și/sau hipotrofie musculară regională * sechele neurologice post-accident vascular cerebral (inclusiv ciume ușoare până la moderate) * sechele după poliomielita * mono- și polinevrite unilaterale sau bilaterale * sindroame radiculare în hernia de disc lombară sau alte discopatii * akinezie idiopatică * atonie sau mitrofie unilaterală sau bilaterală * sindromul de tunel carpian * alungirea brahialului plex 	<ul style="list-style-type: none"> * spondilită anchilozantă * sacroileita * dorsalgie lombosacrală subacută, recurentă sau cronică * Periartrita scapulohumerală * leziuni ale rotatorilor umărului * bursita la nivelul articulațiilor umarului și cotului * tendosinovita * sindr. tunelul carpian * polidiscopatie mono- sau lombară și sacră incipientă sau avansată * sindroame dureroase radiculare secundare patologiilor coloanei vertebrale * alergii secundare defectelor de postură * cifoscolioza * hiperlordoză * deformari ale cutiei toracice artrita reumatoida 	<ul style="list-style-type: none"> * rigiditate articulară după efort sau post-traumatic * dorsalgie LS subacută, recurentă sau cronică * periartrita umarului și cotului * Durere radicală în leziunile măduvei spinării * refacere după contuzii loco-regionale puternice * alungirea plexului brahial * hernii de disc incipiente/avansate, în perioada de conservare sau covalență postoperatorie * recuperarea masei musculare și a forței după fracturi imobilizate ale antebratului * coalescență puternică postcontusională a regiunii întărirea mușchilor umerilor, brațelor și antebratelor, spatelui și regiunii paravertebrale DL 	<ul style="list-style-type: none"> * rigiditate articulară post-traumatică operată * operate de hernii de disc LS * durere radiculară în leziunile operate ale coloanei vertebrale LS * refacere după contuzii loco-regionale puternice * plex brahial alungit operat * sindr. de tunel carpian operat * recuperarea masei musculare și a forței după fracturi de antebrat imobilizate, reduse ortopedic sau chirurgical

C11



Patologie neuromusculara	Patologie osteoarticulara	Patologie postraumatica sportiva	Patologie postraumatica
<ul style="list-style-type: none"> * discopatie sacră * sindr. cozi de cal * pareza (mono-, tetra-, hemi-, para- pareza) * neurodistrofii * scleroză multiplă * boli neurodegenerative * aplazie și/sau hipotrofie musculară regională * sechele neurologice post-accident vascular cerebral (inclusiv ciume ușoare până la moderate) * sechele după poliomielita * mono- și polinevrita plexului sacral unilateral sau bilateral * akinezie idiopatică * atonie sau mitrofie unilaterală sau bilaterală * sindr. piramidale si extrapiramidale * tulburări perineale / prolaps perineal 	<ul style="list-style-type: none"> * Osteoartrita si poliartrita (spondiloza, disartroza, coxartroza) unilaterală sau bilaterală * tulburări ale urechii coxofemorale * discopatii incipiente sau avansate * deformari pelvine * artrita reumatoida * rigidizări ale articulațiilor în poziții vicioase vechi / consolidate * hiperlaxitate ligamentară a membrului inferior * luxații și subluxații congenitale ale șoldului, cu modificări de postură și locomoție * sacroiliita din spondilita anchilozanta * artrita reumatoida 	<ul style="list-style-type: none"> * rigiditate coxofemurală post-traumatică sau suprasolicitare * recuperarea tonusului muscular inghinal posttraumatic sau dupa interventie chirurgicala * prolapsuri sau hernii inghinale sau inghinoscrotale * întărirea mușchilor fesieri și a coapselor 	<ul style="list-style-type: none"> * recuperarea in herniile de disc operate * proteza post sold * recuperarea tonusului muscular inghinal posttraumatic sau dupa interventie chirurgicala * postoperator în prolaps sau hernii inghinale sau inghinoscrotale

C8



Patologie neuromusculara	Patologie osteoarticulara	Patologie postraumatica sportiva	Patologie postraumatica
<ul style="list-style-type: none"> * alungirea plexului brahial, cu afectarea secundara a muschilor aferenti * alungiri ale plexului brahial uni sau bilateral * torticolis congenital sau dobândit * sindroame piramidale sau extrapiramidale * atonie sau mitrofie unilaterală sau bilaterală * spondilită anchilozantă spondilată * Pareză (tetra-, hemi- și para-pareză) * neurodistrofii * scleroză multiplă * aplazie și/sau hipotrofie musculară regională * nevralgie intercostală spontană sau secundară * sechele neurologice post-accident vascular cerebral (inclusiv ciume ușoare până la moderate) * sechele după poliomielita * mono- și polinevrite unilaterale sau bilaterale * sindroame radiculare în hernia de disc lombară sau alte discopatii CDLS * akinezie idiopatică * recuperare post-sindrom meningian 	<ul style="list-style-type: none"> * spondiloza CDL cu sindrom. durere radiculară și/sau insuficiență cerebrală vertebro-bazilară * sindr. Al treilea * polidiscopatie vertebrală CDL incipientă sau avansată mono sau avansată * sindroame dureroase radiculare secundare patologiilor coloanei vertebrale * alergii secundare defectelor de postura * cifoscolioza * hiperlordoză * spondilită anchilozantă spondilată * deformari ale cutiei toracice * artrita reumatoida 	<ul style="list-style-type: none"> * coalescență puternică postcontuzie a regiunilor cervicale, cervicodorsale, dorsale, dorsolumbare, lombosacrale, periumerale, claviculare, scapulohumerale și parasternale * întinderea sau ruptura mușchilor toracelui superior * leziuni ale rotatorilor umărului * alungirea plexului brahial * intindere sau ruptura muschilor toracici sau paravertebrali superiori * refacerea forței musculare regionale după imobilizare prelungită * spondiloza cu sau fara sindroame radiculare secundare * nevralgie intercostală spontană sau reziduală * favorizeaza cresterea capacitatii de efort a cutiei toracice * refacerea tonusului muscular dupa interventia chirurgicala locoregionala * reeducarea contractiei musculare dupa hipertensiune post-efort sau rupturi micromusculare * refacerea tonusului muscular paravertebral dupa operatii de hernie de disc * hernii de disc CDLS incipiente/avansate în timpul conservării sau coalescență postoperatorie 	<ul style="list-style-type: none"> * recuperare postoperatorie după intervenții în încordări musculare sau rupturi ale toracelui superior, umărului, centurii scapulare sau regiunii paravertebrale DL * leziuni operate ale coafei rotatorilor * recuperarea forței și tonusului muscular regional după imobilizare prelungită * spondiloza, cu sau fara sindroame radiculare secundare * nevralgie intercostală spontană sau reziduală * favorizeaza cresterea capacitatii de efort a cutiei toracice * refacerea tonusului muscular paravertebral dupa operatii de hernie de disc DL * refacerea forței musculare după imobilizare post-chirurgicală sau ortopedică DL hernie de disc operata

C18



Patologie neuromusculara	Patologie osteoarticulara	Patologie postraumatica sportiva	Patologie postraumatica
<ul style="list-style-type: none"> * nevralgie intercostală spontană sau secundară * mono- sau polinevrita * pareza spastica * atrofii musculare regionale * micromialgie regională * apraxie motorie * Pareză (tetra-, hemi- și para-pareză) * neurodistrofii * scleroză multiplă * aplazie și/sau hipotrofie musculară regională * sechele neurologice post-accident vascular cerebral (inclusiv ciume ușoare până la moderate) * sechele după poliomielite * mono- și polinevrite unilaterale sau bilaterale * sindroame radiculare în hernia de disc lombară sau alte discopatii CDLS * torticolis * akinezie idiopatică * atonie sau mitrofie unilaterală sau bilaterală * recuperare post-sindrom. meningeală * sindrom piramidal și extrapiramidal 	<ul style="list-style-type: none"> * cifoscolioza * hiperlordoză * deformarea leziunii toracice * sechele de rahitism dureri de spate subacute, recurente și/sau cronice 	<ul style="list-style-type: none"> * întindere sau ruptura muschilor abdominali sau paravertebrali * refacerea forței musculare abdominale sau dorsale după imobilizare prelungită * spondiloza cu sau fara sindroame radiculare secundare * nevralgie intercostală spontană sau reziduală * refacerea tonusului muscular după intervenția chirurgicală abdominală * reeducarea contractiei musculare după hipertensiune post-efort sau rupturi micromusculare * refacerea tonusului muscular paravertebral după operații de hernie de disc DL * recuperarea post-contuzie a coloanei vertebrale * hernii de disc DL incipiente/avansate, în perioada de conservare sau coalescență postoperatorie * coalescență puternică postcontusională a regiunii * întărirea muschilor abdominali și dorsali 	<ul style="list-style-type: none"> * Restabilirea tonusului muscular după o intervenție chirurgicală abdominală * refacerea tonusului muscular paravertebral după operații de hernie de disc DL * întindere sau ruptura muschilor abdominali sau dorsali refacerea forței musculare după imobilizare post-chirurgicală sau ortopedică

C16



Patologie neuromusculara	Patologie osteoarticulara	Patologie postraumatica sportiva	Patologie postraumatica
<ul style="list-style-type: none"> * pareza (mono-, tetra-, hemi- și para-pareza) * neurodistrofii * scleroză multiplă * aplazie și/sau hipotrofie musculară regională * sechele neurologice post-accident vascular cerebral (inclusiv ciuma ușoară până la moderată) * sechele post-polio * sechele ale postencefalopatiei din copilărie * mono- și polinevrite unilaterale sau bilaterale * sindroame radiculare în hernia de disc lombară * akinezie idiopatică * atonie sau metrofie unilaterală sau bilaterală * sindr. piramidale și extrapiramidale * recuperare în hipotrofie moderată (malnutritie proteino-calorică) * tulburări neurodegenerative 	<ul style="list-style-type: none"> * osteoartrita și poliartroza (spondiloza, disartroza, lombara, osteoartrita soldului, gonartroza) unilaterala sau bilaterala * entorse/luxații și subluxații ale genunchiului * întinderea sau ruptura ligamentelor genunchiului * rupturi de menisc * discopatii sacrale incipiente sau avansate * artrita reumatoida * rigidizări ale articulațiilor în poziții vicioase vechi / consolidate * hiperlaxitate ligamentară a membrului inferior * luxații și subluxații congenitale de șold, cu modificări de postură și locomoție * deformari pelvine * sacroiliita din spondilita anchilozanta * artrita reumatoida * recuperare la adolescenți și tineri cu sechele de rahitism 	<ul style="list-style-type: none"> * Întinderea sau ruperea mușchilor membrelor inferioare * monoartroza sau poliartroza membrului inferior (spondiloza, discartroza, osteoartrita de sold, gonartroza) * leziuni de menisc în timpul depozitării * recuperarea postoperatorie a rupturii de menisc * recuperare în ligamentul lateral și/sau încrucisat al genunchiului * instabilități articulare post-forță sau leziuni post-traumatice severe * refacerea masei musculare după imobilizare prelungită, însoțită sau nu de hipotrofie * recuperarea rupturii musculare consolidate, în procesul de vindecare * reductoare de legătură inferior trenului, de diferite grade * crește capacitatea de efort a trenului inferior * coalescență puternică postcontusială a regiunii * restabilirea tonusului muscular în urma intervențiilor chirurgicale vasculare, ortopedice, musculare etc * recuperare regională după traumatism sau intervenție chirurgicală perineală * ameliorarea simptomelor sindromului „coada de cal”. întărirea mușchilor coapsei 	<ul style="list-style-type: none"> * roseata și osteoartrita secundară la nivelul membrelor inferioare * Recuperare post-fractură a trenului inferior * recuperare postprotezată a soldului * recuperare postoperatorie în leziunile de menisc și ligamentul genunchiului * recuperarea masei musculare postmobilizare gips * recuperarea după hernie de disc lombara operată * recuperarea fracturilor pelvine * refacerea tonusului muscular în urma intervențiilor chirurgicale vasculare, ortopedice, oncologice etc * recuperarea rupturii musculare operate/reconstituite, în proces de vindecare

C20



Patologie neuromusculara	Patologie osteoarticulara	Patologie postraumatica sportiva	Patologie postraumatica
<ul style="list-style-type: none"> * nevralgie intercostală spontană sau secundară * mono sau polinevrita uni sau bilaterală * atrofii musculare regionale * micromialgie regională * apraxie motorie * pareza spastica (tetra-, hemi- si para-pareza) * neurodistrofii * scleroză multiplă * aplazie și/sau hipotrofie musculară regională * sechele neurologice post-accident vascular cerebral (inclusiv ciuma ușoară până la moderată) * sechele după poliomielita * sindroame radiculare în hernia de disc lombară sau alte discopatii CDLS * akinezie idiopatică * atonie sau metrofie unilaterală sau bilaterală * recuperare post-sindrom. meningeală * sindroame piramidale si extrapiramidale * alungirea plexului brahial, cu afectare secundara a muschilor uni sau laterali aferenti * torticolis congenital sau dobândit * piramidal sau sindroame extrapiramidale 	<ul style="list-style-type: none"> * cifoscolioza * hiperlordoză * deformarea leziunii toracice * sechele de rahitism * dureri de spate subacute, recurente si/sau cronice * Spondiloza CDL cu sindrom. durere radiculară și/sau insuficiență cerebrală vertebro-bazilară * sindr. Al treilea * polidiscopatie vertebrală CDL incipientă sau avansată mono sau avansată * Sindroame dureroase radicale secundare * patologiiilor coloanei vertebrale * alergii secundare defectelor de postura * spondilită anchilozantă * spondilată * deformari ale cutiei toracice * artrita reumatoida 	<ul style="list-style-type: none"> * intinderi sau rupturi ale muschilor paravertebral, dorsal, umar, scalulohumeral si toracic. * refacerea fortei musculare mentionate, dupa imobilizari prelungite * spondiloza cu sau fara sindroame radiculare secundare * nevralgie intercostală spontană sau reziduală * refacerea tonusului muscular dupa o interventie chirurgicala regionala * reeducarea contractiei musculare dupa hipertensiune post-efort sau rupturi micromusculare * refacerea tonusului muscular paravertebral dupa operatii de hernie de disc C DL * hernii de disc DL incipiente/avansate, în perioada de conservare sau coalescență postoperatorie * periartrita scapulohumerală post-forță sau post-traumatică * intarirea muschilor abdominali si dorsali * coalescență puternică postcontuzie a regiunilor cervicale, cervicodorsale, dorsale, dorsolumbare, lombosacrale, periumerale, claviculare, scapulohumerale și parasternale * alungirea plexului brahial * spondiloza cu sau fara sindroame radiculare secundare * favorizeaza cresterea capacitatii de efort a cutiei toracice * reeducarea contractiei musculare dupa hipertensiune arteriala post-efort sau rupturi micromusculare 	<ul style="list-style-type: none"> * refacerea tonusului muscular după o intervenție chirurgicală în regiune * refacerea tonusului muscular paravertebral după operatii de hernie de disc CDL * refacerea forței musculare după imobilizare post-chirurgicală sau ortopedică prelungită * recuperare postoperatorie după întinderea sau ruptura musculară a toracelui superior, umărului, centurii scapulare sau regiunii paravertebrale CDL, inclusiv hernia de disc * leziuni ale coafei rotatorilor operate * nevralgie operativă rămasă favorizează creșterea capacității de efort a cutiei toracice

C17



Patologie neuromusculara	Patologie osteoarticulara	Patologie postraumatica sportiva	Patologie postraumatica
--------------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------------------

<ul style="list-style-type: none"> * alungiri ale plexului brahial uni sau bilateral * torticolis congenital sau dobândit * sindroame piramidale sau extrapiramidale * atonie sau miotrofie unilaterală sau bilaterală * spondilită anchilozantă spondilată * pareza (tetra-, hemi- și para-pareza) * neurodistrofii * scleroză multiplă * aplazie și/sau hipotrofie musculară regională * sechele neurologice post-accident vascular cerebral (inclusiv ciume ușoare până la moderate) * sechele după poliomielita * mono- și polinevrite unilaterale sau bilaterale * sindroame radiculare în hernia de disc cervicală sau dorsală * akinezie idiopatică * post-sindrom recuperare. meningeală 	<ul style="list-style-type: none"> * spondiloza CD cu sindrom. durere radiculară și/sau insuficiență cerebrală vertebro-bazilară * sindr. Al treilea * CD polidiscopatie vertebrală incipientă sau avansată mono sau avansată * alergii secundare defectelor de postura * cifoscolioza * hiperlordoză * spondilită anchilozantă spondilată * deformari ale cutiei toracice * artrita reumatoida 	<ul style="list-style-type: none"> * coalescența postcontuzie puternică a regiunilor cervicale, cervicodorsale, dorsale și periscapulare * întinderea sau ruptura mușchilor gâtului, spatelui și paravertebrali * alungirea plexului brahial * refacerea forței musculare regionale după imobilizare prelungită * Spondiloza CD cu sau fără sindroame radiculare secundare * nevralgie intercostală spontană sau reziduală * favorizează creșterea capacității de efort a cutiei toracice * refacerea tonusului muscular după intervenția chirurgicală locoregională * reeducarea contractiei musculare după hipertensiune post-efort sau rupturi micromusculare * refacerea tonusului muscular paravertebral după operații de hernie de disc * hernii de disc CD incipiente/avansate în timpul depozitării * întărirea mușchilor din centura scapulohumerală, cea superioară torace și CD paravertebral 	<ul style="list-style-type: none"> * recuperare postoperatorie după intervenții în încordări musculare sau rupturi ale pieptului superior, umărului, centurii scapulare sau regiunii paravertebrale CD * leziuni operate ale coafei rotatorilor * recuperarea forței și tonusului muscular regional după imobilizare prelungită * spondiloza, cu sau fără sindroame radiculare secundare * nevralgie intercostală spontană sau reziduală * favorizează creșterea capacității de efort a cutiei toracice * refacerea tonusului muscular paravertebral după operații de hernie de disc CD * refacerea forței musculare după imobilizare post-chirurgicală sau ortopedică * Hernie de disc CD operata
---	--	--	---